


Κλινικό πρωτόκολλο παραγγελίας ανοσολογικών εξετάσεων αυτοάνοσων ρευματολογικών παθήσεων

Κλινικό πρωτόκολλο παραγγελίας αυτοαντισωμάτων ANCA, anti-PR3, anti-MPO



Σημειώσεις

Έκδοση 1η (Οκτ. 2014)
© Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου

- **Αγγειίτιδα σχετιζόμενη με ANCA (AAV):** νεκρωτική αγγειίτιδα, με λίγη ή καθόλου εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων, προσβολή κυρίως μικρού μεγέθους αγγείων (π.χ. τριχοειδή, φλεβίδια, αρτηριόλια ή μικρού μεγέθους αρτηρίες) και σχετίζεται με τα αντισώματα έναντι PR3 ή MPO. Δεν έχουν όλα τα άτομα θετικά ANCA. Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Wegener), ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss), μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
- **Αγγειίτιδα μη σχετιζόμενη με ANCA (non-AAV):** προσβολή αγγείων μικρού μεγέθους (πορφύρα Henoch-Schoenlein, κρουσφαριναϊμική αγγειίτιδα), μεσαίου μεγέθους (οζώδης πολυαρτηρίτιδα), μεγάλου μεγέθους (αρτηρίτιδα Takayasu, κροταφική [γίγαντοκυτταρική] αρτηρίτιδα)
- **ANCA:** Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (αντισώματα έναντι κυτταροπλάσματος ουδετεροφίλων)
- **anti-MPO [IgG]:** αντισώματα IgG έναντι μυελοϋπεροξειδάσης (Myeloperoxidase [MPO])
- **anti-PR3 [IgG]:** αντισώματα IgG έναντι πρωτεϊνάσης 3 (Proteinase 3 [PR3])

Επιστημονική επιμέλεια

- Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου
- Ανοσολογικό τμήμα, νοσοκομείο Λευκωσίας

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ANCA_5.vsd Ημερ. Αποθήκευσης: 15/10/2014